


KUIDAS MÕJUTAVAD NAKKUSED JA VAKTSINEERIMISED MINU VÄHIRISKI?




Peaaegu iga viies vähk maailmas on põhjustatud nakkusetekitajatest.

Mõned kõige olulisemad vähktõvega seotud nakkused on:

- Inimese papilloomiviirused, mis võivad põhjustada enamikku emakakaela- ja pärakuvähkidest ning mõningaid suuõõne vähkkasvajaid.
- B-hepatiidi ja C-hepatiidi viirused, mis võivad põhjustada maksavähki.

Vaktsiinid on kõige tõhusam viis mõnede nende nakkuste ennetamiseks.

Mida saan ise teha?



Veenduge, et teie lapsed osaleksid B-hepatiidi ja inimese papilloomiviiruse vastastes vaktsineerimisprogrammides.

Nõuanded tegutsemiseks

- 1 Otsige teavet B-hepatiidi ja inimese papilloomiviiruse vastase vaktsineerimise kasutegurite ja vaktsineerimata jätmise ohtude kohta.
- 2 Tutvuge oma lastele mõeldud vaktsiinide saadavuse ja riikliku vaktsineerimiskavaga.
- 3 Tehke teadlik otsus ja pidage meeles, et vaktsineerimata jätmine inimese papilloomiviiruse ja B-hepatiidi vastu võib suurendada vähiriski.

See on üks Euroopa vähktõvevastase tegevusjuhise 12-st tõenditel põhinevast soovitusest. Täiendavat teavet leiate veebisaidilt: cancer-code-europe.iarc.fr/index.php/et/12-viisi



Käesoleva teabelehe töötas projekti BUMPER raames välja sihtasutus Foundation for the Promotion of Health and Biomedical Research of the Valencian Community (Fisabio). Lisateavet projekti kohta leiab siit bumper.cancer.eu



Rahastatud Euroopa Liidu vahenditest. Väljendatud vaated ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega kajasta tingimata Euroopa Liidu või Euroopa Tervishoiu ja Digitaalvaldkonna Rakendusameti (HaDEA) omi. Nende eest ei saa vastutavaks pidada ei Euroopa Liitu ega toetust andvat asutust.

Sisu põhineb Euroopa vähktõvevastase tegevusjuhise 4. väljaandel. Viimati uuendatud 2024. aasta oktoobris.



GENERALITAT
VALENCIANA



Fundació
Fisabio

