


MITEN INFEKTIOT JA ROKOTUKSET VAIKUTTAVAT SYÖPÄRISKIINI?




Lähes yksi viidestä maailman kaikista syövästä on tartunnanaiheuttajien aiheuttama.

Tärkeimpiä syöpää mahdollisesti aiheuttavia infektioita ovat seuraavat:

- ihmisen papilloomavirukset, jotka voivat aiheuttaa useimpia kohdunkaulan ja peräaukon syöpiä sekä joitakin suusyöpiä
- hepatiitti B- ja hepatiitti C -virukset, jotka voivat aiheuttaa maksasyöpää.

Rokotteet ovat tehokkain tapa ehkäistä joitakin näistä infektioista.

Mitä voin tehdä?



Varmista, että lapsesi osallistuvat hepatiitti B -viruksen ja ihmisen papilloomaviruksen rokotusohjelmiin.

Vinkkejä muutoksiin

- 1 Hae tietoa hepatiitti B -viruksesta ja ihmisen papilloomavirusta vastaan rokottamisen hyödyistä ja rokottamatta jättämisen vaaroista.
- 2 Ota selvää lasten rokotusten saatavuudesta ja rokotusaikataulusta omassa maassasi.
- 3 Tee tietoinen päätös ja muista, että rokottamatta jättäminen ihmisen papilloomavirusta ja hepatiitti B-virusta vastaan voi lisätä syöpäriskiä.

Tämä on yksi Euroopan syöväntorjuntaohjeiston 12:sta näyttöön perustuvasta suosituksesta. Lisätietoja on osoitteessa: cancer-code-europe.iarc.fr/index.php/fi/12-tapaa



Tämän tietolehtisen on laatinut Foundation for the Promotion of Health and Biomedical Research of the Valencian Community (Fisabio) BUMPER-hankkeen puitteissa. Lisätietoja hankkeesta on osoitteessa bumper.cancer.eu



Euroopan unionin rahoittama. Ilmaistut näkemykset ja mielipiteet ovat kuitenkin vain kirjoittajan/kirjoittajien omia, eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin tai HaDEA:n näkemyksiä ja mielipiteitä. Euroopan unionia tai avustuksen myöntävää viranomaista ei voida pitää vastuussa niistä.

Sisältö perustuu Euroopan syöväntorjuntaohjeiston neljänteen painokseen. Viimeisin päivitys lokakuussa 2024.



GENERALITAT
VALENCIANA



Fundació
Fisabio

