


KĀ INFEKCIJAS UN VAKCĪNAS IETEKMĒ RISKU SASLIMT AR VĒZI?




Teju piektdaļu visu vēža gadījumu pasaulē rodas infekciju rezultātā.

Dažas no visbūtiskākajām infekcijām, kas ir saistīta ar dažādiem vēža veidiem, ir:

- cilvēka papilomas vīruss, kas var izraisīt lielāko daļu dzemdes kakla vēža un anālā vēža gadījumu, kā arī daļu mutes vēža gadījumu;
- vīrushepatīts B (HBV) un vīrushepatīts C (HCV), kas var izraisīt aknu vēzi;

Vakcīnas ir visefektīvākais veids, kā novērst dažas no šīm infekcijām.

Ko darīt?



Nodrošiniet, lai jūsu bērni piedalītos vakcinācijas programmās pret B hepatītu un cilvēka papilomas vīrusu.

Padomi, kā rīkoties

1. Meklējiet informāciju par ieguvumiem no vakcinācijas pret B hepatītu un cilvēka papilomas vīrusu un par draudiem, ko rada nevakcinēšanās.
2. Uzziniet par pieejamību un vakcinācijas grafiku saviem bērniem jūsu valstī.
3. Pieņemiet apzinātu lēmumu un atcerieties, ka nevakcinēšanās pret cilvēka papilomas vīrusu un B hepatītu var palielināt risku saslimt ar vēzi.

Šis ir viens no 12 uz pierādījumiem balstītajiem ieteikumiem Eiropas Pretvēža rīcības kodeksā. Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, apmeklējiet: cancer-code-europe.iarc.fr/index.php/lv/12-veidi



Šo faktu lapu ir izstrādājis Foundation for the Promotion of Health and Biomedical Research of the Valencian Community (Fisabio) projekta BUMPER ietvaros. Lai iegūtu plašāku informāciju par projektu, varat apmeklēt: bumper.cancer.eu



Finansē Eiropas Savienība. Tomēr paustie uzskati un viedokļi ir tikai autora(-u) uzskati un viedokļi, un tie ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības vai Eiropas Veselības un digitālās izpildaģentūras (HaDEA) uzskatus un viedokļus. Ne Eiropas Savienība, ne piešķirēja iestāde nevar būt atbildīgas par tiem.

Saturs balstīts uz Eiropas Pretvēža rīcības kodeksa 4. izdevumu. Pēdējais atjauninājums 2024. gada oktobrī.



GENERALITAT
VALENCIANA



Fundació
Fisabio

